

Utilice este cuadro para dar seguimiento a sus valores de colesterol malo (los cuales se miden en mg/dl) mientras avanza en su tratamiento con Repatha<sup>®</sup>. Cuando vea a su médico, no olvide **programar su próxima cita** para seguir verificando sus niveles.

**MI OBJETIVO:**

(determinado por mi médico)

CONSULTA/VISITA MÉDICA	FECHA	LDL	ANOTACIONES PERSONALES
------------------------	-------	-----	------------------------

<b>Ejemplo:</b> La visita de hoy	3/26/2020	148	Receta de Repatha <sup>®</sup> recibida
<b>La visita de hoy</b>			
<b>Seguimiento 1</b>			
<b>Seguimiento 2</b>			
<b>Seguimiento 3</b>			
<b>Seguimiento 4</b>			

**Recuerde que si deja de usar Repatha<sup>®</sup> su colesterol puede aumentar. Usted no debe dejar de usar Repatha<sup>®</sup> sin consultar con su médico**

**Uso aprobado**

Repatha<sup>®</sup> es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

- en adultos con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, así como determinados tipos de cirugía cardíaca
- junto con una dieta sola o con medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre conocido como hiperlipidemia primaria (que incluye un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [HFHe]) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

**Información importante de seguridad**

No use Repatha<sup>®</sup> si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha<sup>®</sup>.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional en la página 2.**

## Información importante de seguridad (continuación)

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Las tapas de las agujas en las jeringas precargadas de dosis única y el interior de las tapas de las agujas en los autoinyectores precargados SureClick® de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de dosis única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha®. Consulte con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica sobre los efectos secundarios.

Se lo alienta a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite la página [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

[Consulte la Información de prescripción completa.](#)

©2021 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.