

Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha[®]
(evolocumab) injection
140 mg/mL

**REPATHA[®]
LE DA LA
BIENVENIDA**



Lo que usted debe saber acerca de cómo empezar, incluida información sobre la Tarjeta de copago* para pacientes elegibles con seguro médico comercial.

*El programa está sujeto a máximos y a criterios de elegibilidad; consulte el resumen de los términos y condiciones en la página 2.



¿Qué es Repatha[®]?

Repatha[®] es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

- en adultos con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, así como determinados tipos de cirugía cardíaca.
- junto con una dieta sola o con medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre conocido como hiperlipidemia primaria (que incluye un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [HFHe]) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

Información importante de seguridad

No use Repatha[®] si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha[®].

1 Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

REPATHA[®] LE
DA LA
BIENVENIDA

CÓMO SURTIR SU
RECETA

PARA
EMPEZAR

CÓMO SE USA
REPATHA[®]

QUÉ PUEDE ESPERAR
CON REPATHA[®]

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
DE SEGURIDAD


APOYO

PODRÍA PAGAR \$5 AL MES*

Repatha[®]
(evolocumab) injection 140 mg/mL

REPATHA[®] LE
DA LA
BIENVENIDA

SI TIENE UN SEGURO COMERCIAL, LA TARJETA DE COPAGO DE REPATHA[®] PODRÍA AYUDARLE.

 **Inscríbese** para recibir la Tarjeta de copago de Repatha[®] en Repatha.com/copay o llame al **1-844-REPATHA** (1-844-737-2842)



 **Muéstrele** al farmacéutico la información de su Tarjeta de copago

 **Recoja** su medicamento y pague solo desde **\$5 al mes***

CÓMO SURTIR SU
RECETA

PARA
EMPEZAR

CÓMO SE USA
REPATHA[®]

QUÉ PUEDE ESPERAR
CON REPATHA[®]

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
DE SEGURIDAD

APOYO

*Resumen de términos y condiciones de la Tarjeta de copago de Repatha[®]

Es importante que cada paciente lea y entienda los términos y condiciones completos de la Tarjeta de copago de Repatha[®] (evolocumab). El resumen siguiente no reemplaza la revisión de los términos y condiciones en su totalidad.

Como se describe con más detalle en los términos y condiciones completos, en general:

- La Tarjeta de copago de Repatha[®] está disponible para pacientes con seguro comercial, independientemente de sus necesidades económicas. El programa no es válido para pacientes cuya receta de Repatha[®] esté cubierta en parte o en su totalidad por Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal, ni para pacientes que paguen en efectivo; tampoco es válido donde esté prohibido por ley.
- Con la Tarjeta de copago de Repatha[®], un paciente con seguro comercial que cumpla los criterios de elegibilidad podría pagar desde apenas \$5 de copago al mes como gasto de bolsillo mensual para Repatha[®]. Los gastos de bolsillo mensuales incluyen los costos de copagos, coseguros y deducibles. Amgen pagará los gastos de bolsillo restantes elegibles en nombre del paciente hasta un beneficio mensual máximo, un beneficio anual máximo del programa y/o el beneficio total del programa para el paciente. Los pacientes se responsabilizarán de cubrir todos los montos que superen estos límites.
- El programa ofrece asistencia hasta un beneficio mensual máximo, pero este no se aplicará a Repatha[®] en las primeras 3 recetas de la Tarjeta de copago de Repatha[®] en determinado año calendario.
- La oferta está sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso.
- La Tarjeta de copago de Repatha[®] ofrece apoyo hasta el beneficio mensual máximo, el beneficio anual máximo del programa y/o el beneficio total del programa para el paciente. Si el plan de seguro comercial del paciente impone requisitos adicionales o distintos a los pacientes que reciban beneficios de la Tarjeta de copago de Repatha[®], Amgen tiene el derecho de reducir o eliminar dichos beneficios. La elegibilidad de cada paciente para recibir el beneficio mensual máximo, el beneficio anual máximo del programa o el beneficio total del programa para el paciente queda determinada por la cobertura del tipo de plan comercial que tenga. Llame al 1-844-REPATHA (1-844-737-2842) para consultar con su asesor de RepathaReady[®], quien le ayudará a entender la elegibilidad para la Tarjeta de copago de Repatha[®] y si es probable que la cobertura de seguro específica que usted tenga le haga alcanzar el beneficio mensual máximo, el beneficio anual máximo del programa o el beneficio total del programa para el paciente.
- Consulte los términos y condiciones completos en RepathaEspanol.com/#copaycard.

VISITE REPATHA.COM/COST

¿NO TIENE SEGURO COMERCIAL?

Visite Repatha.com/cost para averiguar cuánto le costaría Repatha[®]. O bien, llame a su plan de seguro para entender su cobertura.

ALGUNAS COSAS QUE DEBE HACER ANTES DE SU PRIMERA INYECCIÓN:



Programe las fechas de su primera inyección y de las siguientes: la primera y las que vienen después. Cada caja contiene una provisión de un mes de Repatha[®].



Haga espacio en el refrigerador (36 °F a 46 °F) para conservar Repatha[®] en su caja original y protegerlo de la luz. Antes de inyectar Repatha[®], tendrá que sacar el dispositivo del refrigerador y dejar que se entibie hasta alcanzar la temperatura ambiente.



Tenga todo listo para desechar el dispositivo usado en un recipiente para objetos punzocortantes (que puede conseguir en la farmacia).



Al viajar, averigüe con la aerolínea su política sobre agujas transportadas en el equipaje de mano. Lleve consigo una copia de su receta o una nota de su médico para los agentes de seguridad de los aeropuertos. Asegúrese de que Repatha[®] tenga etiquetas claramente legibles o que esté en su caja original.



Si se conserva a temperatura ambiente (68° a 77 °F), Repatha[®] mantendrá su eficacia durante un máximo de 30 días.

Para ver información detallada antes de la inyección, lea las **Instrucciones de uso**



INSCRÍBASE EN REPATHAREADY[®]

RepathaReady[®] ofrece recursos y apoyo que le ayudarán a cumplir con constancia su tratamiento para el alto nivel de colesterol malo. Si lo desea, haga clic aquí e inscríbese para recibir recordatorios.

RECIBA RECORDATORIOS

CADA 2 SEMANAS

140 mg/mL



Autoinyector SureClick®

Autoinyector precargado de dosis única para autoinyectarse en su casa con un dispositivo de mano.



Vea un video de demostración sobre el uso del autoinyector SureClick®

Haga clic [aquí](#) para ver las Instrucciones de uso

UNA VEZ AL MES

420 mg/3.5 mL



Sistema Pushtronex®

Infusor corporal de dosis única con cartucho precargado. Autoinyección en su casa con un dispositivo manos libres.



Vea un video de demostración sobre el uso del sistema Pushtronex®

Haga clic [aquí](#) para ver las Instrucciones de uso

Si desea obtener información detallada antes de recibir la inyección, lea las Instrucciones de uso que encontrará en la parte posterior de cada caja de Repatha®.

Obtenga apoyo de enfermería en español –incluso apoyo sobre la inyección– por teléfono y videoconferencia a través del Programa de Enfermería RepathaReady®.

El personal de enfermería de RepathaReady® está disponible por teléfono los 7 días de la semana. Llame al 1-844-REPATHA (1-844-737-2842) de 8 a.m. a 11 p.m., zona horaria del Este.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar.

Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

Para adultos con enfermedades cardíacas

UNA REDUCCIÓN DRÁSTICA DEL COLESTEROL MALO

Esté pendiente de sus niveles de colesterol malo y siga usando Repatha®. Cuando se usa con una pastilla de estatina, puede ayudar a reducir drásticamente el colesterol malo. En ensayos clínicos:

- Hasta el **90%** de las personas observó un descenso drástico en sus niveles de colesterol malo a 70 mg/dl o menos a las 48 semanas
- Repatha® tarda solo **1 mes** en producir resultados
- Al agregar Repatha® a una pastilla de estatina, los pacientes pueden lograr una reducción promedio del 63% en sus niveles de colesterol malo, **en tan solo 3 meses**

Aunque el colesterol malo no es una afección curable, sí puede manejarse. Continúe su tratamiento con Repatha® para poder observar buenos resultados. Si deja de usar Repatha®, sus niveles de colesterol LDL pueden aumentar. No deberá interrumpir su tratamiento con Repatha® sin antes consultar con su médico.

LLEVE UN SEGUIMIENTO DEL COLESTEROL MALO (LDL) Y ESTABLEZCA METAS

Descargue y guarde esta tabla modificable en PDF para llevar un registro de sus valores de colesterol malo (que se miden en mg/dl) y establecer sus metas conforme avance en su tratamiento con Repatha®. Cuando vaya al médico, no olvide programar un seguimiento para comprobar sus niveles.

[DESCARGAR TABLA DE REGISTRO](#)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

5 **Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).**

PERSONAS REALES QUE USAN REPATHA® + UNA PASTILLA DE ESTATINA

Repatha®
(evolocumab) inyección 140 mg/mL

REPATHA® LE
DA LA
BIENVENIDA

CÓMO SURTIR SU
RECETA

PARA
EMPEZAR

CÓMO SE USA
REPATHA®

QUÉ PUEDE ESPERAR
CON REPATHA®

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
DE SEGURIDAD

APOYO



Haga clic aquí
para ver el video

“ Tenía el LDL en 79 y, en mi siguiente chequeo, me entero de que **MI LDL ESTÁ POR DEBAJO DE 10.** Y el médico me dice, “Esto es fantástico, ¡exactamente donde queremos estar!” “

- CÉSAR

“ Aunque me indicaron una dieta cardiosaludable, mi colesterol no cambió. Después de Repatha® me repitieron los análisis de sangre: **EL LDL, QUE HABÍA ESTADO EN 110, HABÍA BAJADO A 45.** “

- CATHY



Haga clic aquí
para ver el video

“ Mi LDL andaba mal: estaba altísimo. Mi nivel de LDL había estado en 151. **¿Y EN MI ANÁLISIS MÁS RECIENTE? ESTOY EN 23.** Sé que estoy haciendo lo correcto. “

- DAN



Haga clic aquí
para ver el video

Los resultados pueden variar de una persona a otra

¿Quiere oír más historias? Vaya a www.Repatha.com/patient-stories

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar.

6 Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

No use Repatha[®] si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha[®].

Antes de comenzar a usar Repatha[®], informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Las tapas de las agujas en las jeringas precargadas de dosis única y el interior de las tapas de las agujas en los autoinyectores precargados SureClick[®] de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex[®] de dosis única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha[®]?

Repatha[®] puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha[®] y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Los efectos secundarios más comunes de Repatha[®] incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha[®]. Consulte con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica sobre los efectos secundarios.

Se lo alienta a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA.

Visite la página www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

[Consulte la Información de prescripción completa.](#)

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Repatha[®]
(evolocumab) injection
140 mg/mL

REPATHA[®] LE
DA LA
BIENVENIDA

CÓMO SURTIR SU
RECETA

PARA
EMPEZAR

CÓMO SE USA
REPATHA[®]

QUÉ PUEDE ESPERAR
CON REPATHA[®]

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
DE SEGURIDAD

APOYO



Al empezar un tratamiento con un nuevo medicamento hay muchas cosas que aprender. Es natural que usted tenga preguntas; aquí estamos para responderlas.

VISITE
REPATHAESPANOL.COM

LLÁMENOS AL
1-844-REPATHA

AMGEN[®]

Cardiovascular